Traumatisme thoracique : Particularités et prise en charge en préhospitalier

AHU Ketata Imen

Introduction:

- ▶ 30 % des admissions en traumatologie
- ▶ Contexte de traumatismes multiples dans 2/3 des cas
- ▶ **Type de lésions:**
 - *Traumatismes ouverts (30%)*
 - *Traumatismes fermés (70%)*
- ▶ 20 a 25% mortalité +++
- ▶ **Mécanisme du traumatisme thoracique:**
 - *AVP: 60%*
 - *Agression: 30%*
 - *Chute: 10%*

- **5 second round !**
- **Approche ABCDE**

5 SECOND ROUND

1/ VOIES AERIENNES LIBRES?

2/ SAIGNEMENT MAJEURS ?

3/POULS ?

ACTION IMMEDIATE

APPROCHE ABCDE

- *L'objectif principale est d'**identifier** et **traiter** les lésions menaçant le pronostic vitale*

Approche ABCDE

- look - listen - feel approach
- respiratory rate and effort
- breath and added sounds
- subcutaneous emphysema
- symmetry of chest movement
- tracheal deviation
- jugular vein distention
- cyanosis

SpO₂ - ETCO₂ - USG - X-ray - CT

- AVPU / GCS
- reactivity and symmetry of pupils
- blood glucose level
- basic neurological examination
- posture
- toxicological examination

- airway noises
- position of head
- foreign body
- fluid, secretions
- oedema

- heart rate
- blood pressure
- capillary refill time
- bleeding
- skin colour
- blood samples
- diuresis

ECG - USG - CT - X-ray

- head to toe examination
- medical history
- temperature
- injuries
- oedemas
- scars
- signs of drug abuse
- skin changes
- signs of infection/sepsis

6

Approche ABCDE

Critères de gravité

- ▶ les antécédents du patient :
 - un âge de plus de 65 ans,
 - une pathologie pulmonaire ou cardiovasculaire chronique,
 - un trouble de la coagulation congénital ou acquis (traitement anticoagulant ou antiagrégant),
- ▶ les circonstances de survenue telles qu'un traumatisme de forte cinétique et/ou un traumatisme pénétrant (G1+).

Critères de Vittel

- **Variables physiologiques :**
 - Score de Glasgow < 13
 - PAS < 90mmHg
 - SpO2 < 92%
- **Éléments de cinétique :**
 - Ejection d'un véhicule
 - Autre passager décédé dans le même véhicule
 - Chute > 6 mètres
 - Victime projetée ou écrasée
 - Appréciation globale (déformation du véhicule, vitesse estimée, absence de casque ou de ceinture
 - Blast
- **Réanimation pré hospitalière :**
 - Ventilation assistée
 - Remplissage > 1000ml de colloïdes
 - Catécholamines
 - Pantalon antichoc gonflé
- **Lésions anatomiques :**
 - Traumatisme pénétrant de la tête, cou, thorax, abdomen, bassin, bras ou cuisse
 - Volet thoracique
 - Brulure sévère, inhalation de fumée
 - Fracas du bassin
 - Suspicion d'atteinte médullaire
 - Amputation
 - Ischémie aiguë de membre
- **Terrain à évaluer :**
 - Âge > 65 ans
 - Insuffisance cardiaque ou coronarienne
 - Insuffisance respiratoire
 - Grossesse (2 et 3^{ème} trimestre)
 - Troubles de la crase sanguine

**1 seul critère (hors terrain)
= traumatisé grave**

Détecter et traiter une détresse immédiate:

- **Pneumothorax compressif:**

- douleur thoracique de type pleural
- une dyspnée, une tachypnée +++.

=> Détresse respiratoire +/- hémodynamique

- L'emphysème sous-cutané, des craquements ou des crépitations à la palpation
- Auscultation : diminution des murmures vésiculaires-----→silence

Auscultatoire

- percussion: hypersonorité

Hémothorax massif

- ▶ sang > 1 500 ml dans la cavité thoracique.
- ▶ **Signes d'un hémothorax massif**
 - ▶ *un Choc hypovolémique*
 - ▶ *Matité à la percussion sur l'hémithorax affecté*
 - ▶ *une Diminution ou abolition des bruits respiratoires*
 - ▶ *une opacité qui recouvre l'hémithorax pouvant masquer tout pneumothorax sous-jacent et coexistant*

drainage thoracique en préhospitalier:

*épanchements (pneumothorax et/ou hémothorax)
compressifs mettant en jeu le pronostic vital immédiat*

**Thoracostomie+++
exsufflation**

Exsufflation à l'aiguille

- Indication : pneumothorax compressif

- Cathéter 14 G (orange)
Longueur 5 cm
 - Laisser le cathéter
en place
- ➔ Solution temporaire...

Traumatisme pénétrant en préhospitalier

► Etiologies:

- *Plaie par arme blanche*
- *Plaie par arme à feu*
- *AVP*

► Plaie avec corps étranger : - Ne pas enlever !

► Antibioprophylaxie en cas de traumatisme pénétrant du thorax

Plaies trachéo-bronchiques

▶ Diagnostic si:

- Emphysème sous cutané expansif
- Pneumothorax avec bullage persistant

▶ Examens complémentaires:

- TDM
- Fibroscopie bronchique +++
- évoquer plaie œsophage => FOGD

Penser a traiter...

- ▶ une obstruction des voies respiratoires
- ▶ un pneumothorax compressif
- ▶ une plaie thoracique ouverte
- ▶ un hémithorax massif
- ▶ une tamponnade cardiaque

FAST échographie en préhospitalier:

Recommandations

En complément de l'examen clinique, les experts suggèrent que l'échographie pleuro pulmonaire soit associée à la FAST échographie en préhospitalier à la recherche d'un épanchement gazeux ou liquidien associée à une évaluation péricardique. Cet examen doit être réalisé par un praticien expérimenté et ne doit pas retarder la prise en charge (G2+).

- Protocole FAST
- Détection des épanchements :
 - Plèvre

les modalités et les objectifs de traitement de la douleur en pré hospitalier

Proposition 4.a.1

Lors d'un traumatisme thoracique, le contrôle de la douleur est une urgence. Les experts recommandent une évaluation systématique de l'intensité de la douleur en utilisant une échelle numérique (EN) de première intention, sinon une échelle verbale simple (EVS). La mesure de l'intensité doit se faire au repos, mais aussi lors de la toux et de l'inspiration profonde. (G2+).

Proposition 4.a.2

En présence d'une douleur intense une titration par morphine est recommandée avec pour objectif le soulagement défini par une $EN \leq 3$ ou $EVS < 2$. (G1+)

Proposition 4.a.3

Pour la mobilisation du patient, après une titration morphinique bien conduite mais insuffisante, les experts recommandent l'utilisation de la kétamine (Avis d'experts).

Si un geste invasif s'avère nécessaire il doit se faire avec une analgésie sédation efficace (Avis d'experts).

Fiche réflexe en préhospitalier:

- ▶ Eliminer détresse vitale immédiate :
- ▶ Stabilisation respiratoire: ventilation mécanique en dernier recours, ventilation protectrice
- ▶ Stabilisation hémodynamique
- ▶ Intérêt de l'échographie
- ▶ Contrôle de la douleur
- ▶ Drainage des épanchements compressifs
- ▶ Bilan au régulateur pour place en trauma center

orientation

- ▶ un transport médicalisé vers un centre de référence dès l'existence de signes de détresse respiratoire et/ou circulatoire

le pronostic des traumatisés les plus graves est amélioré
s'ils sont pris en charge dans des centres experts

Aux urgences:

- ▶ Trauma leader = Relève avec le médecin du SMUR
- ▶ Réévaluation des urgences vitales:
 - 1) - *Hémorragie extériorisée*
 - 2) - *Détresse respiratoire*
 - 3) - *Détresse hémodynamique*
 - 4) - *Détresse neurologique*
- ▶ Mise en condition de sécurité :
 - 1) *arrêt hémorragie,*
 - 2) *Drainage pneumothorax,*
 - 3) *IOT,*
 - 4) *remplissage, amines vasoactives*

Conclusion:

- ▶ Traumatisme thoracique = traumatisme grave
- ▶ Critères de gravité => trauma center (augmente la survie)
- ▶ Atteinte de la paroi peut aussi être grave
- ▶ Importance de la prise en charge initiale et l'orientation
- ▶ Traitement de la douleur !!!

**MERCI DE
VOTRE
ATTENTION**